

WARNINGS

- **Withholding period:** Allow the following minimum number of days between the last application and harvesting or use as fodder:

Potatoes	42 days	Onions	80 days
Tobacco	42 days	Grapes	100 days
Pineapples	56 days	Peaches	100 days
Groundnuts (fodder)	63 days	Citrus (bearing trees)	150 days

Note: The above recommended withholding period from last application to harvest will meet the local residual requirements but is not guaranteed to meet export requirements.

- Handle with extreme care.
- Poisonous by swallowing, inhalation and skin contact.
- Toxic to fish, bees and wildlife.
- Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
- Store under lock and key, away from food and feedstuffs.
- Inflammable – do not store or handle near open flame.
- Re-entry: Do not enter treated area within 2 days after treatment unless wearing protective clothing.
- **In case of poisoning, call a doctor immediately and make label available to him.**

Although this remedy has been extensively tested under a large variety of conditions the registration holder does not warrant that it will be efficacious under all conditions because the action and effect thereof may be affected by factors such as abnormal soil, climatic and storage conditions, quality of dilution water, compatibility with other substances not indicated on the label and the occurrence of resistance of the pest against the remedy concerned as well as by the method, time and accuracy of application. The registration holder furthermore does not accept responsibility for damage to crops, vegetation, the environment or harm to man or animal or for lack of performance of the remedy concerned due to failure of the user to follow label instructions or to the occurrence of conditions, which could not have been foreseen in terms of the registration. Consult the supplier in the event of any uncertainty.

PRECAUTIONS

- Do not inhale insecticide fumes or spray mist.
- Wear protective clothing (overall, rubber boots, gloves and respirator).
- After use and in case of accidental skin contact, wash thoroughly with soap and water.
- Wash contaminated clothing.
- Do not eat, drink or smoke whilst mixing or applying or before washing hands and face and change of clothing.
- Prevent contamination of food, feedstuff, eating utensils and drinking water.
- Prevent drift of spray mist onto other crops, grazing, rivers, dams or areas not under treatment.
- Triple rinse the empty container in the following manner: Invert the empty container over the spray tank and allow to drain for at least 30 seconds after the flow has slowed down to a drip. Thereafter, rinse empty container three times with a volume of water equal to a minimum of 10 % of that of the container. Add the rinsings to the contents of the spray tank before destroying the container.
- Destroy empty container by perforation and flattening and never use for any other purpose.
- Clean applicator after use and dispose of wash water where it will not contaminate crops, grazing, dams or river.

SYMPTOMS OF HUMAN POISONING

This is a cholinesterase inhibitor. Symptoms of human poisoning are malaise, weakness, headache, nausea, vomiting, giddiness and anorexia.

FIRST AID TREATMENT

EYES:

Flush with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately.

SKIN:

Remove contaminated clothing. Wash affected area with plenty of soap and water. Get medical attention if irritation develops. Contaminated clothing must be thoroughly washed before reuse.

INHALATION:

Remove person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Get medical attention immediately.

INGESTION:

Get medical attention immediately. Induce vomiting by drinking one or two glasses of water and then tickle the back of the throat with a finger.

Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. Do not do direct mouth to mouth respiration.



FARMAG FENAMIPHOS 400 EC

Reg. No/Nr. L10720, Act/Wet No/Nr 36 Van/Of 1947

A systemic soil applied emulsifiable concentrate for the control of nematodes on potatoes, citrus, pineapples, grapes, peaches, nectarines, groundnuts, onions and tobacco and a leaf treatment on potatoes for the control of nematodes and aphids only in the Western Cape.

'n Sistemiese grondtoegediende emulgeerbare konsentraat vir die beheer van aalwurms in aartappels, sitrus, nektariens, perskes, pynappels, wingerde, grondbone, uie en tabak en as 'n blaarbespuiting op aartappels vir die beheer van aalwurms en plantluise slegs in die Wes-Kaap.

IRAC INSECTICIDE GROUP CODE	1B	INSEKDODERGROEKODE
------------------------------------	-----------	---------------------------

ACTIVE INGREDIENT/AKTIEWE BESTANDDEEL:

Fenamiphos (organophosphate).....400 g/l.....Fenamifos (organofosfaat)

Manufacture Date:

Vervaardigingsdatum:

Batch No.:

Lotnommer:

NET MASS/ INHOUD

l

**SEE ENCLOSED LEAFLET FOR FULL PARTICULARS
SIEN INGESLOTE VOUBLIJET VIR VOLLE BESONDERHEDE**

REGISTRATION HOLDER/REGISTRASIEHOUER:

Farm-Ag International (Pty) Ltd.

Co. Reg. No.: 2005/011761/07

61 Marshall Drive, Old Mill Industrial Park, Mt Edgecombe, 4300 • Tel. (031) 003 3486

POISON INFORMATION CENTRE: 082 446 8946

UN No./VN Nr. 3018



**VERY TOXIC
UITERS GIFTIG**



NOTE TO PHYSICIAN

This is an organophosphate insecticide. If symptoms of poisoning are present, the administration of atropine sulphate is indicated. 2-PAM may also be administrated.

Do not give morphine.

RESISTANCE WARNING

For resistance management, **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** is a group code **1B** insecticide. Any insect population may contain individuals naturally resistant to **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** and other group code **1B** insecticides. The resistant individuals can eventually dominate the insect population if these insecticides are used repeatedly. These resistant insects may not be controlled by **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** or any other group code **1B** insecticide.

To delay insecticide resistance:

- Avoid exclusive repeated use of insecticide from the same insecticide group code. Alternate or tank mix with products from different insecticide codes.
- Integrate other control methods (chemical, cultural, biological) into insect control programmes.

For specific information on resistance management contact the registration holder of this product.

DIRECTIONS FOR USE: Use only as directed.

Compatibility

The compatibility of **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** with other products has not yet been tested and may be influenced by the formulation of the products involved as well as the quality of the water.

A physical compatibility test should always be conducted before spraying.

Mixing Instructions and application

Half fill the spray tank with water and add the required quantity of **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** while the water in the tank is being stirred. Add water to make up the desired spray volume. Keep the spray mixture agitated during mixing and spraying.

Spraying should be carried out on cool, windless days with rapid drying conditions.

TOBACCO: To avoid possible crop damage **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** foliar sprays should only be applied under cool conditions onto healthy actively growing tobacco plants that are not under water stress.

POTATOES: In the case of potatoes, good coverage of the plants is essential. The plants should be in a state of healthy growth and not subject to stem and foliage factors such as blight, tuber moth and hail. Similarly the plants should be free from weed competition. Healthy seed tubers of uniform maturity should be planted in order to ensure simultaneous emergence, which is important.

Under certain conditions **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** will cause deformed leaves and necrotic spots may also occur. The leaf symptoms differ from those caused by virus diseases and will not be mistaken by Plant Pest Control Inspectors. Seed potato producers should inform inspectors when using **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC**. When heavy nematode infestations occur, **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** will control the problem but potato producers should not expect an absolutely clean crop. Dry conditions after application may lead to reduced efficacy. The potatoes should be lifted as soon as the full crop potential is reached. The practice of storing potatoes in the ground may result in a late nematode infestation.

CITRUS: For plant densities of more than 300 trees per hectare the maximum application rate per tree becomes proportionately less so as not to exceed the maximum application rate of 30 liter **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** per hectare or 100 ml per basin.

Refer to table below:

Application rate in mℓ product/m² basin area					
NO OF TREES/HA	BASIN AREA				
	4m²	6m²	8m²	10m²	12m²
200	10	10	10	10	8
250	10	10	10	10	8
300	10	10	10	8	8
350	10	10	10	7	7
400	10	10	9	6	6
450	10	10	8	5	5
500	10	10	7	5	5
550	10	9	6	4	4

NB. **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** will control nematodes as indicated in the table below but **not** *Meloidogyne chitwoodi* and *M. fallax*.

CROP/PEST	DOSAGE	REMARKS
TOBACCO Root-knot nematodes Tobacco spider mite	<u>Before transplanting:</u> Soil fumigation <u>After transplanting:</u> 3 ℥ in 500 ℥ water/ha	Fumigate soil prior to planting with a registered soil fumigant. 1. Apply as a directed foliar spray onto the leaves below the growing point (heart) of the plant three weeks after transplanting. 2. Repeat the above application 5 to 6 weeks after transplanting. Warning: do not apply during hot, dry conditions on plants that are under water stress. This treatment will also control tobacco spider mite if present at the time of application.
GROUNDNUTS Nematode (<i>Ditylenchus destructor</i>)	4 - 8 ℥/ha	Irrigated lands: Apply immediately after planting as an overall treatment in approximately 300 ℥ water/ha. Irrigate immediately after application. Dry lands: Apply as an overall treatment in approximately 500 ℥ water/ha and incorporate mechanically (e.g. by harrowing) to a depth of 7.5 cm before planting. Sufficient rainfall is necessary for optimal efficacy of FARMAG FENAMIPHOS 400 EC . Use the lower rate on dry lands crops or where nematode pressure is less.
POTATOES All areas except Northern Cape and North West Province Nematodes	250 mL/100 m plant furrow (25 ℥/ha for rows 1m apart)	Draw the planting furrows. Spray the FARMAG FENAMIPHOS 400 EC onto total furrow area, plant potatoes, then close furrows.
	150 mL/100 m plant furrow (15 ℥/ha for rows 1m apart)	Use the lower dosage on table potatoes in the Eastern Highveld of Mpumalanga. Use only on 4 year rotation crop on lands with a low infestation for July-August plantings. Apply as directed above.
POTATOES Northern Cape only Nematodes	<u>Before planting:</u> Soil fumigation followed by 250 mL/100 m plant furrow (25 ℥/ha for rows 1 m apart)	Fumigate the land with a registered fumigant prior to transplanting. Draw the planting furrows. Spray the FARMAG FENAMIPHOS 400 EC onto the total furrow area, plant potatoes and then close furrows.

CROP/PEST	DOSAGE	REMARKS
POTATOES Western Cape only	Before planting: Soil fumigation	Fumigate the land with a registered fumigant prior to transplanting.
Nematodes and Aphids	Apply 4 ℥ in 450 - 500 ℥ water/ha. A total of six (6) sprays are required.	The first three sprays should be applied at weekly intervals commencing about 7 - 10 days after the emergence of the plants. The fourth and subsequent sprays are applied at 14-day intervals. Spray nozzles should be mounted so as to direct the spray to the plant rows ensuring full coverage.
CITRUS Nematodes	10 mL/m ² basin area	Apply evenly to the soil surface in the basin area, after the trees have become established and repeat annually in Spring. Irrigate immediately after application with at least 25 mm water.
Young non-bearing trees		
Bearing trees	Initial treatment: 4 - 10 mL/m ² basin area Maintenance treatment: 5 mL/m ² basin area	Apply in Spring evenly to the soil surface in tree basin area. Irrigate immediately after application with at least 25 mm water. Application rate depends on number of trees/ha and size of basin area - see table under "Directions for use". NOTE: Do not exceed 30 ℥ product/ha or 100 mL/basin. See "Directions for use". Do not use on lemons and kumquats. Apply the following season in Spring as indicated above. Thereafter repeat annually.
ONIONS Nematodes	7.5 ℥/ha	Bulb and transplanted onions: Apply evenly to the soil in at least 250 ℥ water prior to planting or transplanting and incorporate mechanically (e.g. shallow disc). Application can also be made immediately after planting or transplanting. Incorporation immediately after application by means of overhead irrigation.
TOMATOES Rootknot nematodes	Pre-plant soil treatment: 250 mL/100 m row in 30 cm wide band over the row	Apply 250 mL/100 m row in a 30 cm wide band over the planting row. Apply to the land prior to transplanting at any time from two weeks before until immediately before transplanting. Calibrate the applicator with clean water before the actual application in order to determine the volume of water the applicator requires to cover the required distance of band treatment. Mix the dosage prescribed in the volume of water thus determined. After the FARMAG FENAMIPHOS 400 EC is applied it should immediately be incorporated lightly into the top layer of soil by mechanical means or by sprinkler irrigation. Under careful supervision, it could also be applied onto standing irrigation water diverted into planting basins. Avoid washing the material away with strong flooding while it is still on the soil surface.
VINEYARDS Nematodes	2.5 mL/m ² (250 mL/2.5 ℥ water/100 m row as a 1 m wide band over the row)	FARMAG FENAMIPHOS 400 EC must be applied as a 50 cm wide band on either side of the vine row (the bankie) to a weed free surface, either as a Spring application 14 days before expected bud burst or as an Autumn application directly after harvest. FARMAG FENAMIPHOS 400 EC must be incorporated in the soil either by sufficient rain in order to wash the product into the soil or by irrigation. If at least 20 mm of rain has not fallen within 14 days of application, then incorporate by means of irrigation, applying 13 mm followed by a further 13 mm of water 10 days later. NOTE: FARMAG FENAMIPHOS 400 EC may be applied through a suitable calibrated microjet irrigation system provided application is according to directions given above.

CROP/PEST	DOSAGE	REMARKS
PEACHES, including Nectarines Nematodes NOTE: leaf damage may occur when low quality trees are treated.	2,5 ml/m ² in 2 l water	Apply within six weeks after establishment of the young trees, in Spring and again in March to April. Repeat the two applications during the second year. Apply the mixture to an area of 1 m ² around each tree. Hereafter a post harvest treatment may be applied annually if necessary. Apply at a rate of 2,5 ml/m ² to the drip area. In the case where trees are planted 2 metre or less apart, the mixture can be applied continuously on a 1 metre bankie over the row of trees. The soil should be moist, weed-free and bare. Incorporate after application by irrigation with 13 mm water followed by 13 mm water 10 days later.
PINEAPPLES Nematodes	6,25 l in a minimum of 1000 l water/ha	Apply by ground-rig. Use only on plant crop. A total of three sprays per crop cycle is required. The first foliar spray should be applied at the first signs of root formation. Two subsequent sprays are applied at three-month intervals. Spray nozzles should be mounted so as to direct the spray onto the rows, ensuring full coverage. Flower inducing chemicals should not be applied within three months of the last FARMAG FENAMIPHOS 400 EC foliar spray. Very dry or wet conditions can adversely influence the treatment. Slight chlorosis, which disappears with time, may occur after treatment.

WAARSKUWINGS

- **Onthoudingsperiode:** Laat die volgende minimum aantal dae tussen die laaste toediening en oes of as gebruik vir voer toe:

Aartappels	42 dae	Uie	80 dae
Tabak	42 dae	Druwe	100 dae
Pynappels	56 dae	Perskes	100 dae
Grondbone (voer)	63 dae	Sitrus (draende bome)	150 dae

Nota: Die aanbevole onthoudingsperiode tussen laaste toediening en oes voldoen aan die vereistes vir plaaslike residuvlakke maar mag dalk nie voldoen aan die vereistes vir uitvoer nie.

- Hanteer uitsers versigtig.
- Giftig deur velkontak, inname en inaseming.
- Giftig vir vis, bye en wild.
- Hou buite bereik van kinders, oningesigte persone en diere.
- Bêre agter slot en grendel, weg van voedsel en voer.
- **Vlambaar** – moenie naby vlamme bêre of hanteer nie.
- **Herbetreding:** Moet nie behandelde gebied binne 2 dae na toediening betree tensy beskermende klere gedra word nie.
- **In geval van vergiftiging, ontbied onmiddellik 'n geneesheer en toon die etiket aan hom.**

Alhoewel hierdie middel omvattend onder 'n groot verskeidenheid toestande getoets is, waarborg die registrasiehouernie dat dit onder alle toestande doeltreffend sal wees nie aangesien die werking en effek daarvan beïnvloed kan word deur faktore soos abnormale grond-, klimaats- en bergingstoestande, kwaliteit van verdunningswater, verenigbaarheid met ander stowwe wat nie op die etiket aangedui is nie en die voorkoms van weerstand van die plaag teen die betrokke middel asook die metode, tyd en akkuraatheid van toediening. Verder aanvaar die registrasiehouer nie verantwoordelikheid vir skade aan gewasse, plantgroei, die omgewing of vir nadelige effek op mens of dier of vir gebrek aan prestasie van die betrokke middel as gevolg van die versuim van die gebruiker om etiketaanwysings na te kom of as gevolg van die ontstaan van toestande wat nie kragtens die registrasie voorsien kon word nie. Raadpleeg die verskaffer in die geval van enige onsekerheid.

VOORSORGMAATREËLS

- Vermy inaseming van plaagdoderdampe en sputmis.
- Dra beskermende klere (oorpak, rubberstewels, handskoene en oogbeskerming).
- Na gebruik en in geval van toevalige velkontak, was deeglik met seep en water.
- Was besoedelde klere.
- Moenie eet, drink of rook tydens vermenging of toediening of voordat hande en gesig gewas en ander klere na gebruik aangetrek is nie.
- Voorkom besoeding van voedsel, voer, eetgerei en drinkwater.
- Voorkom die oorwaai van sputnewel na ander gewasse, weiding, riviere, damme of gebiede wat nie onder behandeling is nie.
- Spoel die leë houer driekeer soos volg uit: Keer die leë houer oor die sputtenk om en driekeer vir minstens 30 sekondes na die vloeい tot 'n drup verminder het. Spoel die leë houer daarna driekeer uit met 'n volume water gelykstaande aan 'n minimum van 10 % van die inhoud van die houer. Gooi die spoelwater by die inhoud van die sputtenk voordat die houer vernietig word.
- Vernietig leë houer deur gate daarin te maak en plat te slaan en moet vir geen ander doel gebruik nie.
- Maak die sput apparaat deeglik skoon na gebruik. Raak ontslae van uitspoelwater waar dit nie gewasse, weiding, damme of riviere sal besoedel nie.

SIMPOTME VAN MENSLIKE VERGIFTIGING

Hierdie middel is 'n cholinesterase inhibeerder. Simptome van menslike vergiftiging is lusteloosheid, swakheid, hoofpyn, mislikheid, vomering, duiselheid en anoreksia.

NOODHULP BEHANDELING

- | | |
|------------|--|
| OE: | Spoel uit met baie water vir ten minste 15 minute. Kry onmiddellik mediese behandeling. |
| VEL: | Verwyder besmette klere. Was besmette vel met volop seep en water. Kry mediese behandeling indien irritasie ontwikkel. Besmette klere moet deeglik gewas word voor hergebruik. |
| INASEMING: | Verwyder die persoon na vars lug. Verkry onmiddellik mediese behandeling. Indien geen asemhaling, gee kunsmatige asemhaling. |

INNAME PER MOND: Verkry onmiddellike mediese behandeling. Veroorsaak vomering deur een of twee glase water te drink en daarna die agterste gedeelte van die keel met 'n vinger te prikkel.
Moet nooit vomering aanmoedig of enige iets per mond aan 'n bewusteloze persoon toedien nie. Moet nie direkte mond-tot-mond asemhaling toepas nie.

NOTA AAN GENEESHEER

Hierdie is 'n organofosfaat insektdoder. Indien simptome van vergiftiging voorkom, dien atropiensulfaat toe. 2-PAM kan ook toegedien word. Moet nie morfien toedien nie.

WEERSTANDWAARSKUWING

FARMAG FENAMIPHOS 400 EC is 'n groepkode **1B** insektdoder. Enige populasie van 'n spesifieke insek mag individue insluit wat 'n natuurlike weerstand teen **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC**, of enige ander groepkode **1B** insektdoder het. Indien hierdie insektdoders herhaaldelik aangewend word, kan die weerstandbiedende individue uiteindelik die insekpopulasie oorheers. Hierdie weerstandbiedende insekte sal waarskynlik nie meer **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** of enige ander groepkode **1B** insektdoder beheer word nie.

Om weerstand teen insektdoders te vertraag:

- Verminder die eksklusiewe herhaaldelike gebruik van insektdoders met dieselfde groepkode. Wissel af met, of gebruik tenkmengsels van produkte in verskillende insektdodergroepkodes.
- Integreer ander beheeraatreëls (chemies, verbouing, biologies) in insektdoderprogramme.

Vir spesifieke inligting oor weerstandsbestuur kontak die registrasiehouer van hierdie produk.

GEBRUIKSAANWYSINGS: Gebruik slegs soos aangedui.

Verenigbaarheid

Die verenigbaarheid van **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** met ander produkte is nie bepaal nie en kan beïnvloed word deur die formulasie van die betrokke produk asook deur die kwaliteit van die water.
'n Fisiese verenigbaarheidstoets moet altyd uitgevoer word alvorens gespuit word.

Menginstruksies en toediening

Maak die sputtenk halfvol met water en voeg die verlangde hoeveelheid **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** by terwyl die water geroer word. Voeg water by totdat die verlangde sputvolume verkry is. Hou die sputmengsel in roering tydens vermenging en toediening.

Spuit verkiekslik op koel, windlose dae wanneer afdroging vinnig sal geskied.

TABAK: Om moontlike skade te verhoed moet **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** toegedien word onder koel toestande as 'n gerigte blaarspuiting op aktiefgroeende tabakplantte wat nie onder vogstremming verkeer nie.

AARTAPPELS: Die plante moet deeglik bedek word. Die plante moet in 'n gesonde groeitoestand wees en nie onderworpe wees aan stam en blaarskade soos roses, aartappelmot en hael nie. Die plant moet ook nie blootgestel wees aan onkruidkompetisie nie. Gesonde saadaartappels in 'n eenvormige stadium van ontwikkeling moet geplant word. Dit is belangrik om te verseker dat plante gelyk opkom. Onder sekere omstandighede sal **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** misvormde blare en nekrotiese kolle veroorsaak. Die blaarsimptome verskil van die van virussiektes en die Plantplaag-beheerinspekteurs sal nie daaroor verwarr word nie. Saadaartappelproduuseurs moet inspekteurs inlig indien **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** gebruik is. Waar swaar aalwurmbesmettings voorkom sal **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** die probleem beheer maar aartappelproduuseerdeurs kan nie 'n absolute skoon oes verwag nie. Droë toestande na toediening mag lei tot 'n vermindering in effektiwiteit. Sodra volle oespotentiaal bereik is, behoort die aartappels uitgehaal te word. Die praktyk om aartappels in die grond te bewaar, mag 'n laat aalwurmbesmetting tot gevolg hê.

SITRUS: Ingeval van plantdigtheid van meer as 300 bome/ha word die maksimum toedieningshoeveelheid per boom proporsioneel minder sodat die maksimum toedieningshoeveelheid van 30 liter **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** per hektaar of 100 mL per besproeibare area nie oorskry word nie. Raadpleeg onderstaande tabel:

Toedieningshoeveelheid in ml produk/m ² besproeiingsbakarea					
AANTAL BOME/HA	BESPROEIINGSBAKAREA				
	4m ²	6m ²	8m ²	10m ²	12m ²
200	10	10	10	10	8
250	10	10	10	10	8
300	10	10	10	8	8
350	10	10	10	7	7
400	10	10	9	6	6
450	10	10	8	5	5
500	10	10	7	5	5
550	10	9	6	4	4

NB. **FARMAG FENAMIPHOS 400 EC** sal aalwurms, soos in die tabel hieronder aangedui, beheer maar **nie**
Meloidogyne chitwoodi en *M. fallax* **nie**.

GEWAS/PLAAG	DOSIS	OPMERKINGS
TABAK Knopwortelaalwurms Tabakspinmyt	Voor uitplant: Grondberoking	Behandel grond voor uitplant met 'n geregistreerde berokingsmiddel.
	Na uitplant: 3l in 500 l water/ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dien toe as 'n gerigte blaarsputting onderkant die groepunt (hart) van die plant drie weke na uitplant. 2. Herhaal bogenoemde toediening 5 tot 6 weke na uitplant. <p>Waarskuwing: Moenie tydens warm, droë toestande op plante wat onder vogstremming verkeer, toedien nie. Bogenoemde behandeling sal ook tabakspinmyt beheer indien teenwoordig tydens toediening.</p>
GRONDBONE Aalwurm (<i>Ditylenchus destructor</i>)	4 - 8 l/ha	<p>Besproeide lande: Dien toe onmiddellik na plant as 'n algehele toediening in ongeveer 300 l water/ha. Besproei onmiddellik na toediening.</p> <p>Droëlande: Dien toe as 'n algehele toediening in ongeveer 500 l water/ha en inkorporeer meganies (bv. deur in te eg) tot 'n diepte van 7.5 cm voordat geplant word. Genoegsame reën is noodsaaklik vir optimale effektiwiteit van FARMAG FENAMIPHOS 400 EC. Gebruik die laer dosis op droëlandgewasse of waar die aalwurmdruk laag is.</p>
AARTAPPELS Alle areas behalwe Noord-Kaap en Noord-Wes provinsie	250 ml/100 m plantvoor (25 l/ha wanneer plantrye 1 m uitmekaar is)	Trek die plantvore. Dien die FARMAG FENAMIPHOS 400 EC toe op die algehele plantvoorarea, plant die aartappels en maak dan die plantvore toe.
Aalwurm	150 ml/100 m plantvoor (15 l/ha wanneer plantrye 1 m uitmekaar is)	Gebruik die laer dosis slegs op tafelaartappels in die Oostelike Hoëveld van Mpumalanga. Gebruik slegs na 'n vierjaar wisselbou met nie-vatbare gewasse, op gronde met 'n lae infestasiedruk en op Julie-Augustus aanplantings. Dien toe soos hierbo aangedui.

GEWAS/PLAAG	DOSIS	OPMERKINGS
AARTAPPELS Slegs Noord-Kaap	Voor plant: Grondberoking	Behandel grond voor plant met 'n geregistreerde berokingsmiddel.
Aalwurm	Gevolg deur: 250 mℓ/100 m plantvoor (25 ℓ/ha wanneer plantrye 1 m uitmekaar is)	Trek die plantvore. Dien die FARMAG FENAMIPHOS 400 EC toe op die algehele plantvoorarea, plant die aartappels en maak dan die plantvore toe.
AARTAPPELS Wes-Kaap alleenlik	Voor plant: Grondberoking	Behandel grond voor plant met 'n geregistreerde berokingsmiddel.
Aalwurm en plantluse	Dien 4 ℓ in 450 - 500 ℓ water/ha toe. 'n Totaal van ses (6) bespuitings is nodig.	Dien die eerste drie bespuitings weekliks toe. Begin omrent 7-10 dae na die opkom van die plante te spuit. Die vierde en daaropvolgende bespuitings moet elke 14 dae toegedien word. Die spuitpunte moet so gemonteer wees dat spuitstof op die plantrye gerig word om volle bedekking te verseker.
UIE Aalwurm	7.5 ℓ/ha	Bol- en uitgeplante uiie: Dien egalig toe op die grondoppervlak in minstens 250 ℓ water net voor plant of uitplanting en inkorporere meeganries (bv. vlak dis). Toediening kan ook gemaak word onmiddellik na plant of uitplanting. In hierdie geval moet inkorporasie onmiddellik na plant of uitplanting deur middel van oorhoofse besproeiing gedoen word.
PYNAPPELS Aalwurm	6,25 ℓ in 'n minimum van 1000 ℓ water/ha	Dien toe met grondtoerusting. Gebruik slegs op geplante gewas. 'n Totaal van drie bespuitings per oessiklus word benodig. Die eerste blaarbepsuiting moet by die eerste teken van wortelontwikkeling toegedien word. Twee daaropvolgende bespuiting word met 3-maande tussenposes toegedien. Spuitkoppe moet geransklik word om te verseker dat die spuitstof die plantrye deeglik bedek. Blom-indusurerende middels moet nie binne 3 maande vanaf die laaste FARMAG FENAMIPHOS 400 EC -blaarbepsuiting toegedien word nie. Baie droë of nat toestande mag die behandeling nadelig beïnvloed. Geringe vergeling wat mettertyd verdwyn mag voorkom na 'n behandeling.
SITRUS Aalwurms		
Jong nie-draende bome	10 mℓ/m ² besproeiingsbak-oppervlakte	Dien egalig op die grondoppervlak in die besproeiingsbak toe wanneer die bome gevlestig is, en herhaal jaarliks tydens Lente. Besproei onmiddellik na toediening met minste 25 mm water.
Draende bome	<u>Aanvanklike toediening:</u> 4 - 10 mℓ/m ² besproeiingsbak-oppervlakte	Dien egalig, tydens Lente, op die grondoppervlak in die besproeibakarea toe. Besproei onmiddellik na toediening met ten minste 25 mm water. Toedieningshoeveelheid hang af van die aantal bome/ha en grootte van besproeiingsbak - sien tabel onder "Gebruiksaanwyssings". NOTA: Moet nie 30 ℓ/ha of 100 mℓ/besproeibakoppervlakte oorskry nie. Lees "Gebruiksaanwyssings". Moet nie op surflemone en kumkwatte toedien nie.
	<u>Onderhoudstoediening:</u> 5 mℓ/m ² besproeiingsbak-oppervlakte	Dien die volgende seisoen tydens Lente soos hierbo aangedui toe. Herhaal daarna jaarliks.

GEWAS/PLAAG	DOSIS	OPMERKINGS
TAMATIES Knopwortelaalwurm	<u>Voor plant grondbehandeling:</u> 250 mL/100 m ry in 30 cm breë band oor die ry	Dien 250 mL/100 m ry in 'n 30 cm breë band oor ry toe. Dien toe op land waar uitgeplant gaan word enige tyd vanaf 2 weke voor tot onmiddellik voor uitplanting. Kalibreer die toedieningsapparaat met skoon water voor toediening geskied om te bepaal hoeveel water as draer nodig sal wees om behandeling toe te pas oor die verlange afstand van die bandbehandeling. Meng die voorgeskrewe dosis in die volume water aldus bepaal. Na FARMAG FENAMIPHOS 400 EC toegedien is, moet dit onmiddellik liggies in die boonste grondlaagie ingewerk word deur middel van die meganiese metodes of ingeloog word met sprinkelbesproeiing. Onder goeie toesig kan dit ook op stilstaande besproeiingswater wat in die plantebakke afgeker is, toegedien word. Verhoed egter wegspoeling van die materiaal terwyl dit nog op die grondoppervlak lê.
WINGERDE Aalwurm	2,5 mL/m ² (250 mL/2,5 ℥ water/100 m ry as a 1 m breë band oor die ry)	FARMAG FENAMIPHOS 400 EC moet as 'n 50 cm breë band op albei kante van die wingerdry op die bankie van 'n onkruidvry- oppervlak, of as 'n lentetoediening 14 dae voor verwagte bot, of as 'n herfsttoediening onmiddellik na oes toegedien word. FARMAG FENAMIPHOS 400 EC moet in die grond ingekorporeer word deur of genoegsame reën ten einde die produk in die grond in te was, of deur middel van besproeiing. As ten minste 20 mm reën nie binne 14 dae vanaf toediening gevall het nie, inkorporeer dan deur te besproei teen 13 mm water gevvolg deur 'n verdere 13 mm water 10 dae later. NOTA: FARMAG FENAMIPHOS 400 EC mag deur 'n behoorlik gekalibreerde mikro-besproeiingssisteem toegedien word, mits toediening ooreenstem met gebruiksaanwysings soos uiteengesit onder "Opmerkings" hierbo.
PERSKES ingesluit Nektariens	Aalwurm NOTA: Blaarbeskadiging mag voorkom by bome van 'n minderwaardige gehalte.	2,5 mL/m ² in 2 ℥ water Dien binne 6 weke na vestiging van die jong bome in die Lente en weer in die daaropvolgende Maart – April toe (na-oes) toe. Herhaal hierdie twee toedienings in die tweede jaar. Dien die mengsel toe op 'n area van 1 m ² om elke boom toe. Hierna, dien 'n behandeling elke jaar na oes toe indien nodig. Dien toe teen 2,5 mL/m ² in die druparea. In gevalle waar bome 2 meter of nader aan mekaar in die ry geplant is, kan die mengsel aaneenlopend op 'n 1 meter druparea oor die ry bome toegedien word. Die grond moet klam, kaal en vry van onkruidwees. Inkorporeer na toediening deur te besproei met ten minste 13 mm water opgevolg deur 'n verdere 13 mm water 10 dae later.



FARMAG FENAMIPHOS 400 EC

Reg. No/Nr. L10720, Act/Wet No/Nr 36 Van/Of 1947

A systemic soil applied emulsifiable concentrate for the control of nematodes on potatoes, citrus, pineapples, grapes, peaches, nectarines, groundnuts, onions and tobacco and a leaf treatment on potatoes for the control of nematodes and aphids only in the Western Cape.

'n Sistemiese grondtoegediende emulgeerbare konsentraat vir die beheer van aalwurms in aartappels, sitrus, nektariens, perskes, pynappels, wingerde, grondbone, uie en tabak en as 'n blaarbespuiting op aartappels vir die beheer van aalwurms en plantluise slegs in die Wes-Kaap.

IRAC INSECTICIDE GROUP CODE

1B

INSEKDODERGROEKODE

ACTIVE INGREDIENT/AKTIEWE BESTANDDEEL:

Fenamiphos (organophosphate).....400 g/l.....Fenamifos (organofosfaat)

Manufacture Date:

Vervaardigingsdatum:

Batch No.:

Lotnommer:

NET MASS/ INHOUD

l

**SEE ENCLOSED LEAFLET FOR FULL PARTICULARS
SIEN INGESLOTE VOUBLIJET VIR VOLLE BESONDERHEDE**

REGISTRATION HOLDER/REGISTRASIEHOUER:

Farm-Ag International (Pty) Ltd.

Co. Reg. No.: 2005/011761/07

61 Marshall Drive, Old Mill Industrial Park, Mt Edgecombe, 4300 • Tel. (031) 003 3486

POISON INFORMATION CENTRE: 082 446 8946

UN No./VN Nr. 3018



VERY TOXIC
UITERS GIFTIG

